

## Оптимальные задачи на графах

### Вариант 6

**Задача 1.** Нахождение кратчайшего пути в графе.

$$\begin{aligned}(X_1, X_2) &= 3, (X_4, X_9) = 3, \\(X_1, X_4) &= 5, (X_4, X_{10}) = 4, \\(X_1, X_5) &= 8, (X_5, X_7) = 5, \\(X_2, X_6) &= 4, (X_5, X_8) = 6, \\(X_2, X_7) &= 6, (X_6, X_7) = 3, \\(X_2, X_8) &= 7, (X_6, X_{10}) = 5, \\(X_3, X_5) &= 9, (X_6, X_8) = 3, \\(X_3, X_7) &= 5, (X_7, X_{10}) = 9, \\(X_3, X_8) &= 4, (X_8, X_9) = 4, \\(X_4, X_5) &= 5, (X_8, X_{10}) = 5, \\(X_4, X_8) &= 6, (X_9, X_{10}) = 6.\end{aligned}$$

### Решение.

Воспользуемся алгоритмом Дейкстры. Постоянные пометки будем обозначать знаком «\*», а остальные рассматривать как временные.

1. Начальная вершина  $X_1$ , значит, пометка  $l(X_1) = 0^*$ ,  $l(X_2) = \dots = l(X_{10}) = \infty$ .

Первая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_1$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_1) + c(X_1, X_i))$ :

$$l(X_2) = \min(\infty, 0^* + 3) = 3, \quad l(X_4) = \min(\infty, 0^* + 5) = 5, \quad l(X_5) = \min(\infty, 0^* + 8) = 8.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(3, 5, 8) = 3$ , т.е. возьмем  $X_2$ .

4.  $X_2$  получает пометку  $l(X_2) = 3^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_2$ .

Вторая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_2$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_2) + c(X_2, X_i))$ :

$$l(X_6) = \min(\infty, 3^* + 4) = 7, \quad l(X_7) = \min(\infty, 3^* + 6) = 9, \quad l(X_8) = \min(\infty, 3^* + 7) = 10.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(5, 8, 7, 9, 10) = 5$ , т.е. возьмем

$X_4$ .

4.  $X_4$  получает пометку  $l(X_4) = 5^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_4$ .

Третья итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_4$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_4) + c(X_4, X_i))$ :

$$l(X_5) = \min(8, 5^* + 5) = 8, \quad l(X_8) = \min(10, 5^* + 6) = 10, \quad l(X_9) = \min(\infty, 5^* + 3) = 8,$$

$$l(X_{10}) = \min(\infty, 5^* + 4) = 9.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(8, 7, 9, 10, 8, 9) = 7$ , т.е. возьмем

$X_6$ .

4.  $X_6$  получает пометку  $l(X_6) = 7^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_6$ .  
Четвертая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_6$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_6) + c(X_6, X_i))$ :

$$l(X_7) = \min(9, 7^* + 3) = 9, \quad l(X_8) = \min(10, 7^* + 3) = 10, \quad l(X_{10}) = \min(9, 7^* + 5) = 9.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(8, 9, 10, 8, 9) = 8$ , возьмем  $X_5$ .

4.  $X_5$  получает пометку  $l(X_5) = 8^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_5$ .  
Пятая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_5$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_5) + c(X_5, X_i))$ :

$$l(X_3) = \min(\infty, 8^* + 9) = 17, \quad l(X_7) = \min(9, 8^* + 5) = 9, \quad l(X_8) = \min(10, 8^* + 6) = 10.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(9, 10, 8, 9, 17) = 8$ , т.е. возьмем  $X_9$ .

4.  $X_9$  получает пометку  $l(X_9) = 8^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_9$ .  
Шестая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_9$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_9) + c(X_9, X_i))$ :

$$l(X_8) = \min(10, 8^* + 4) = 10, \quad l(X_{10}) = \min(9, 8^* + 6) = 9.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(9, 10, 9, 17) = 9$ , возьмем  $X_7$ .

4.  $X_7$  получает пометку  $l(X_7) = 9^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_7$ .  
Седьмая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_7$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_7) + c(X_7, X_i))$ :

$$l(X_3) = \min(17, 9^* + 5) = 14, \quad l(X_{10}) = \min(9, 9^* + 9) = 9.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(10, 9, 14) = 9$ , т.е. возьмем  $X_{10}$ .

4.  $X_{10}$  получает пометку  $l(X_{10}) = 9^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_{10}$ .  
Восьмая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_{10}$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_{10}) + c(X_{10}, X_i))$ :

$$l(X_8) = \min(10, 9^* + 5) = 10.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(10, 14) = 10$ , т.е. возьмем  $X_8$ .

4.  $X_8$  получает пометку  $l(X_8) = 10^*$ .

5. Т.к. не все вершины графа имеют постоянные пометки, то повторяем алгоритм для  $X_8$ .  
Девятая итерация.

2. Для соседних вершин с  $X_8$  найдем  $l(X_i) = \min(l(X_i), l(X_8) + c(X_8, X_i))$ :

$$l(X_3) = \min(14, 10^* + 4) = 14.$$

3. Найдем минимальную пометку из всех временных:  $\min(14) = 14$ , т.е. возьмем  $X_3$ .

4.  $X_3$  получает пометку  $l(X_3) = 14^*$ .

5. Т.к. все вершины графа имеют постоянные пометки, то конец алгоритма.

**Задача 2.** Определить максимальный поток из  $P_0$  в  $P_7$ .

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		8		12	10	0		10
$P_1$	18		14	15	11			
$P_2$		13		19			18	
$P_3$	0	16	12				0	
$P_4$	14	18						13
$P_5$	15						15	
$P_6$			14	16		16		14
$P_7$	12				0		12	

**Решение.**

Выберем произвольно один из возможных путей из  $P_0$  в  $P_7$ . Например,  $P_0 \rightarrow P_7$ .

Элемент  $(0, 7)$  отмечаем знаком «-», а  $(7, 0)$  – знаком «+». Пропускная способность этого пути  $X_1 = (0, 7) = 10$ .

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		8		12	10	0		10-
$P_1$	18		14	15	11			
$P_2$		13		19			18	
$P_3$	0	16	12				0	
$P_4$	14	18						13
$P_5$	15						15	
$P_6$			14	16		16		14
$P_7$	12+				0		12	

Вычитаем  $X_1$  из ячеек со знаком «-» и прибавляем к ячейкам со знаком «+».

Выбираем новый путь из  $P_0$  в  $P_7$ . Например,  $P_0 \rightarrow P_4 \rightarrow P_7$ .

Элементы  $(0, 4)$ ,  $(4, 7)$  отмечаем знаком «-», а  $(4, 0)$ ,  $(7, 4)$  – знаком «+». Пропускная способность этого пути  $X_2 = \min\{(0, 4), (4, 7)\} = \min\{10, 13\} = 10$ .

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		8		12	10-	0		0
$P_1$	18		14	15	11			
$P_2$		13		19			18	
$P_3$	0	16	12				0	
$P_4$	14+	18						13-
$P_5$	15						15	
$P_6$			14	16		16		14
$P_7$	22				0+		12	

Вычитаем  $X_2$  из ячеек со знаком «-» и прибавляем к ячейкам со знаком «+».

Выбираем новый путь из  $P_0$  в  $P_7$ . Например,  $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_6 \rightarrow P_7$ .

Элементы (0, 1), (1, 2), (2, 6), (6, 7) отмечаем знаком «-», а (1, 0), (2, 1), (6, 2), (7, 6) – знаком «+». Пропускная способность этого пути

$$X_3 = \min\{(0, 1), (1, 2), (2, 6), (6, 7)\} = \min\{8, 14, 18, 14\} = 8.$$

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		8-		12	0	0		0
$P_1$	18+		14-	15	11			
$P_2$		13+		19			18-	
$P_3$	0	16	12				0	
$P_4$	24	18						3
$P_5$	15						15	
$P_6$			14+	16		16		14-
$P_7$	22				10		12+	

Вычитаем  $X_3$  из ячеек со знаком «-» и прибавляем к ячейкам со знаком «+».

Выбираем новый путь из  $P_0$  в  $P_7$ . Например,  $P_0 \rightarrow P_3 \rightarrow P_2 \rightarrow P_6 \rightarrow P_7$ .

Элементы (0, 3), (3, 2), (2, 6), (6, 7) отмечаем знаком «-», а (3, 0), (2, 3), (6, 2), (7, 6) – знаком «+». Пропускная способность этого пути

$$X_4 = \min\{(0, 3), (3, 2), (2, 6), (6, 7)\} = \min\{12, 12, 10, 6\} = 6.$$

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		0		12-	0	0		0
$P_1$	26		6	15	11			
$P_2$		21		19+			10-	
$P_3$	0+	16	12-				0	
$P_4$	24	18						3
$P_5$	15						15	
$P_6$			22+	16		16		6-
$P_7$	22				10		20+	

Вычитаем  $X_4$  из ячеек со знаком «-» и прибавляем к ячейкам со знаком «+».

Выбираем новый путь из  $P_0$  в  $P_7$ . Например,  $P_0 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1 \rightarrow P_4 \rightarrow P_7$ .

Элементы (0, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 7) отмечаем знаком «-», а (3, 0), (1, 3), (4, 1), (7, 4) – знаком «+». Пропускная способность этого пути

$$X_5 = \min\{(0, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 7)\} = \min\{6, 16, 11, 3\} = 3.$$

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		0		6-	0	0		0
$P_1$	26		6	15+	11-			
$P_2$		21		25			4	
$P_3$	6+	16-	6				0	
$P_4$	24	18+						3-
$P_5$	15						15	
$P_6$			28	16		16		0
$P_7$	22				10+		26	

Вычитаем  $X_5$  из ячеек со знаком «-» и прибавляем к ячейкам со знаком «+».

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		0		3	0	0		0
$P_1$	26		6	18	8			
$P_2$		21		25			4	
$P_3$	9	13	6				0	
$P_4$	24	21						0
$P_5$	15						15	
$P_6$			28	16		16		0
$P_7$	22				13		26	

В столбце  $P_7$  только нули. Вычитая из элементов первой таблицы элементы последней, получаем итоговую таблицу со значениями  $(i, j)$ , определяющими максимально возможный поток:

	$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$P_0$		8		9	10	0		10
$P_1$	-8		8	-3	3			
$P_2$		-8		-6			14	
$P_3$	-9	13	6				0	
$P_4$	-10	-3						13
$P_5$	0						0	
$P_6$			-14	0		0		14
$P_7$	-10				-13		-14	

Максимальный поток равен  $\nu = (0, 1) + (0, 3) + (0, 4) + (0, 7) = 8 + 9 + 10 + 10 = 37$ .